Typ Poly near the Coarna neagra (par erreur) 1188Mtp4 Collection Vassal-Montpellier II. 1456 Coarna néagra

diminipating and a standard and a st





DESIGNATION: Comma regue CLOS XI PLANCHE /4 RANG S SOUCHE 6 Vigueur : 2 Port : érig. - ½ érig. - couché. Date de Véraison: 317.68 Date de Maturité : 29.68 x Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - C. Millerandage: h 13 . L M - C. Baie : (TG) (G) WY P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. fus Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 avec pépins - apyrène. s 30 Jus inc. - coloré. 5 4 1

Juntumbunts

Coarna neagra DESIGNATION CLOS X PLANCHE 14 RANG & SOUCHE 6 Vigueur: 2,5 PORT : $(erig) - \frac{1}{2} (erig) - couché$ Pédoncule : L - M - C Millerandage : () Date de Véraison: 11. 8-69 Date de Maturité : 17 9 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - (P) : (1) - M - C BAIE : TG - G - M - P 30 X19 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg) - N SAVEUR : s m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 s 2 f avec pépins - apyrène s 39 JUS : (inc. - coloré s 5 &

DESIGNATION Coarna néagra CLOS PLANCHE | RANG S souche Vigueur : M,5 PORT : érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 2 5-8-20 Date de Véraison : Date de Maturité: Pourriture : 5511 $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}}: G - M - P : L - M - C.$ BAIE : TG - (G - N - P. 20X18 disc. - sph. - (11) - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - N. SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE: avec pénins - apyrène. JUS : (înc. - coloré. \$43

Année: 1967

Implacement ... XI. 1456... Désignation ... Coarna meagra...

nhononlantodan<u>am</u>ihatias

	Nombre total		1		
		8,3	133	18.3	
1	! 5	! 0	! 2	1 3 1	GZ.
×	1	: !	!	1 !	1 16-3-16+
3 8	1	1	1	1	Dlei +3
4	15	11	12	13	

Année / 1968
Emplacement ... II. 14.55 Désignation ... Coarna neagra

	Nombre total	Dates							
		20.3	25.3	!!	!	!			
1	1 4 !	0	! 3 . !	!	!	Ē			
2	2		!!!	!	1	s I			
3	13	1	2 4	!	!	1			
4	14	b	4 -	!	į	!			
5	e		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	1	!			

alantanlantanlantanlantan

Désignation: Coarra neagra

Emplacement: XI. 14,8'6 24 20 whe 1 fasciation.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumburb

Colonne

épanoui 🛈 - moyen 2 - globuleux 3. 41 -

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonnoux

blanc o- fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 42 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7)-2-3 duvetcuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans lo cas où la première feuille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Violal 2.5.66

Désignation: Coarna neagra Emplacement: XI 14,563.4

Juntandanta

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auvotoux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (.)

(F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni () anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouten floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 68

Désignation :

Juntumlanda

Emplacement: XI 148'6 A 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 3 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRum 66

Coarna néagra XI 14 56

Désignation : Emplacement :

Juntumlumti

FEUILLE ADULTE. colonne 34 petite 1 - noyenne (2) grande 3. Face supériours : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9. Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervuros: Face supéricure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inf frieure: verte 1 - particllement rouge (3) entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- 40 coloré () particllement coloré 2 autre 3.

anglo pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: XI. 1h. \$6

Juntanlanti

Désignation: Coarna negra

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache (4)- Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

30 × 21

26 - Très grosse () - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuc 6) - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrolet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6.)

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

-Calvo 68

```
Coarna neagra
DEHCHINATION: XI 14 $6 A. 1
                                        SARHENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntanlandi

Calvo to

```
Désignation: Coarna néagra
 Origine :
 Emplacement: XI - 14 56
8 - Angle des nervures ..... 0 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 0 - 0 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : ferme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ...... 0 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. •u dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - 2 - 3.
                    Forme
                             : 4-(5).
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Juntumbunti

Nº d'ordre: 1188_04

Domergue 72